

Zus



Informații despre produs

Herbosol®

p 0,88 | pH 6,0 - 7,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
82,9 % Ulei de parafină rafinat	-
17,1 % Formulanti	-

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în Abhängigkeit von der Bodengüte: schwerer Boden, hoher Humusgehalt 0,2 l/ha; leichter Boden, geringer Humusgehalt 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Cereale	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Cartof	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Leguminoase	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Porumb	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Rapiță	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



România S.R.L. | Șos. București-Urzeni nr. 64C | 077010 - Afumați, jud. ILFOV | Tel. +40 (0) 21.310.6903 | office@lebosol.ro | www.lebosol.de/ro

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Floarea soarelui	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Sfeclă de zahăr	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Căpșun	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Arbuști fructiferi	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Legume	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Tutun	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)
Brazi	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor peliculare	0,2 - 0,4 l/ha (în funcție de profilul solului: soluri bogate, cu conținut ridicat de humus - 0,2 l/ha, soluri sărace/ușoare, cu conținut redus de humus - 0,6 l/ha)	în amestec cu erbicidele preemergente (peliculare)

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.