

RMix

MADE IN GERMANY

Informații despre produs

Lebosol[®] -Mix Rapiță și Floarea soarelui SC

p 1,48 | pH 8,5

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
4,1 % Bor total (B) sub formă de borat de calciu	61
4,8 % Mangan total (Mn) sub forma de oxid de mangan	71
0,5 % Molibden solubil în apă (Mo) sub forma de molibdat de sodiu	7

suplimentar mai conține: 8,7 % Oxid de calciu (129 g/l CaO); 9,2 % Sulf (136 g/l S)

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Rapiță	Producție, rezistență la iernare	2 - 3 l/ha (+ dezvoltarea sistemului radicular, rezistență la îngheț, dezvoltare optimă)	toamna, începând cu stadiul de 4-6 frunze
Rapiță	Înflorit și maturizare uniforme, producție + dezvoltarea unui aparat foliar sănătos, formarea unui sistem radicular puternic, influențează pozitiv procesul de formare, rol în formarea silicvelor și al numărului de seminte/silicvă. crește rezistența la boli.	2 - 3 l/ha	primăvara, până la înfloritul deplin
Floarea soarelui	Înflorit și maturizare uniforme, producție + dezvoltarea unui aparat foliar sănătos, formarea unui sistem radicular puternic, influențează pozitiv procesul de formare, rol în formarea silicvelor și al numărului de seminte/silicvă. crește rezistența la boli.	1 - 2 l/ha	primăvara, până la înfloritul deplin

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

