

Mo



Informații despre produs

Lebosol[®] -Molibden

p 1,37 | pH 7,6

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
15,8 % Molibden solubil în apă (Mo)	217

suplimentar mai conține: 7,6 % Sodiu total (104 g/l Na)

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu molibden, eficiență în asimilarea azotului (N), producție, stimulează fotosinteza	0,25 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 200 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,1%)	în caz de necesitate
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu molibden, eficiență în asimilarea azotului (N), producție, stimulează fotosinteza	Fertirigare	Adresați-vă unui consilier expert!
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu molibden, eficiență în asimilarea azotului (N), producție, stimulează fotosinteza	0,25 l/ha (Bei Blattdüngung in mindestens 200 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,1%ig)	în caz de necesitate
Pășuni și plante furajere	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	2 - 3 aplicări cu 0,25 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Leguminoase	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	1 - 2 mal 0,25 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	1 - 2 aplicări cu 0,25 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Rapiță	Gegen "Peitschenstiel"-Symptome, ("Whiptail"), Vitalität, N-Effizienz	1 - 2 mal 0,25 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Producție, pentru prevenirea simptomelor tip subțierea limbului foliar, vitalitate	0,25 l/ha	toamna, începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	N-Effizienz, Vitalität	1 - 2 mal 0,25 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	Gegen Klemmherzigkeit und "Peitschenstiel"-Symptome ("Whiptail"), Vitalität, N-Effizienz	1 - 2 mal 0,25 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Producție, pentru prevenirea deformării și alungirii limbului foliar, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 0,25 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Fructe citrice	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität (Gelbfleckigkeit)	1 - 4 mal 0,25 l/ha	Ab weiße Knospe
Legume	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	1 - 2 aplicări cu 0,25 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Varză, verdețuri și ceapă	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, pentru prevenirea deformării limbului foliar, eficiența de utilizare a azotului (N), pentru prevenirea simptomelor de alungire a frunzelor, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 0,25 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume rădăcinoase	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, pentru prevenirea deformării limbului foliar, eficiența de utilizare a azotului (N), pentru prevenirea simptomelor de alungire a frunzelor, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 0,25 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	1 - 2 mal 0,25 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	1 - 2 mal 0,25 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	1 - 2 aplicări cu 0,25 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.