

PKMax



Informații despre produs

Lebosol[®] -PK-Max

p 1,61 | pH 8,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
23,8 % Fosfat solubil în apă (P ₂ O ₅)	385
27,4 % Potasiu solubil în apă (K ₂ O)	440

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Zur Phosphor- und Kaliumversorgung, Ertrag, mehr Vitalität (z.B. bei Kälte), N-Effizienz, Energie- und Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Wurzelbildung	5 - 10 l/ha (in mindestens 200 l Wasser. 0,5 - 1%ig bei Normalkultur. 0,25 - 0,5%ig bei empfindlichen Kulturen unter Glas/Folie.)	în caz de necesitate
	N-Effizienz, Vitalität	1 - 3 mal 5 - 10 l/ha	în caz de necesitate
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu fosfor și potasiu	5 - 10 l/ha (în minimum 200 l apă/ha respectiv în concentrație de 0,5 - 1%; la culturile sensibile și culturile din spații protejate, în concentrație de 0,25 - 0,5%)	în caz de necesitate
	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha	de la dezmugurit / înfrunzit
La toate culturile	Zur Phosphor- und Kaliumversorgung, Ertrag, mehr Vitalität (z.B. bei Kälte), N-Effizienz, Energie- und Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Wurzelbildung	Fertigation	Adresați-vă unui consilier expert!
Cereale	Echilibru energetic, producție, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	2 aplicări cu 6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și bălțire)	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Cereale	Echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate, rezistență la iernare	6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și bălțire)	toamna, începând cu stadiul de 3 frunze
Cereale	Kornqualität, Proteingehalt, Winterhärte	1 - 2 mal 6 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Pășuni și plante furajere	Echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	2 - 4 aplicări cu 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Pășuni și plante furajere	Förderung der Anfangsentwicklung (im Frühjahr), N-Effizienz, Winterhärte	2 - 5 mal 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Cartof	Knollenansatz, Knollen-/Schalenqualität, Knollenwachstum, Sortierung	2 - 4 mal 6 - 10 l/ha	la îngroșarea stolonilor
Cartof	Producție, calitatea tuberculilor și a pielii, creșterea tuberculilor	2 aplicări cu 6 l/ha	începând cu stadiul când diametrul tuberculilor atinge 10 mm
Cartof	Producție, tuberizare, calitatea tuberculilor, sortare	2 aplicări cu 6 l/ha	la îngroșarea stolonilor
Leguminoase	Knöllchenbildung, Qualität, Proteingehalt	1 - 2 mal 6 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Formarea nodozităților, calitate, maturizare	2 aplicări cu 6 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



România S.R.L. | Șos. București-Urliceni nr. 64C | 077010 - Afumați, jud. ILFOV | Tel. +40 (0) 21.310.6903 | office@lebosol.ro | www.lebosol.de/ro

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Porumb	Dezvoltare inițială, echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire)	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität	1 - 2 mal 6 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Ölgehalt	1 - 2 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	1 - 2 aplicări cu 6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire)	primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înfloritului
Floarea soarelui	Dezvoltare inițială, echilibru energetic, eficiența de utilizare a azotului (N), vitalitate	6 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire)	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Ölgehalt	1 - 2 mal 6 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	Structura frunzei, dezvoltare inițială, eficiența de utilizare a azotului (N), creșterea sistemului radicular, sinteza zaharurilor	2 aplicări cu 6 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, Zuckerbildung	1 - 3 mal 6 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	2 aplicări cu 6 - 8 l/ha	la începutul perioadei de vegetație
Căpșun	Fermitatea fructelor, mărirea fructelor	1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Căpșun	Vitalität, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 4 mal 6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fruite seminoase	Influență pozitivă asupra virajului de culoare în roșu a fructelor, asupra mărimii și fermității fructelor	2 - 4 aplicări cu 6 - 8 l/ha	de la căderea fiziologică din iunie până la recoltare
Fruite seminoase	Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 4 mal 6 - 8 l/ha	cu 4 respectiv cu 2 săptămâni înainte de recoltare
Fruite sămburoase	Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 4 mal 6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fruite sămburoase	Influență pozitivă asupra fermității fructelor, mărimii acestora, conținutului de zaharuri	2 aplicări cu 6 - 8 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Arbuști fructiferi	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	2 aplicări cu 6 - 8 l/ha	la începutul perioadei de vegetație
Arbuști fructiferi	Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 4 mal 6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Fermitatea fructelor, mărirea fructelor	1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Fruite citrice	Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 4 mal 6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Struguri de masă	Vitalität, Beerenhautfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 4 mal 6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Struguri de masă	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	2 aplicări cu 6 - 8 l/ha	din stadiul de 5 frunze până la începutul înfloritului
Struguri pentru vin	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	2 aplicări cu 6 - 8 l/ha	din stadiul de 5 frunze până la începutul înfloritului
Struguri pentru vin	Vitalität, Beerenhautfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 4 mal 6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Sparanghel	Echilibru energetic, producție, eficiența de utilizare a azotului (N), depozitarea substanțelor de rezervă, vitalitate	1 - 3 aplicări cu 6 - 10 l/ha	de la mijlocul perioadei de vegetație
Legume	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	1 - 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha (în special în condiții de temperaturi scăzute și băltire)	când plantele au suficientă masă foliară

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Legume	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, innere Qualität, Blattqualität	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	1 - 2 aplicări cu 6 - 8 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Vitalität, innere Qualität, Blattqualität	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Echilibru energetic, producție, eficiența de utilizare a azotului (N), calitate, vitalitate	2 - 5 aplicări cu 6 - 8 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Hamei	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, innere Qualität	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Tutun	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	2 - 4 aplicări cu 6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Tutun	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, innere Qualität	1 - 2 mal 6 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Brazi	Dezvoltare inițială, echilibru energetic și hidric, eficiența de utilizare a azotului (N)	1 - 3 aplicări cu 6 - 8 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Brazi	N-Effizienz, Vitalität	1 - 3 mal 5 - 10 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Plante decorative	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Blattqualität	1 - 3 mal 5 l/ha	în caz de necesitate
Gazon și grădini	Influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale, formării sistemului radicular, vitalității	1 - 5 aplicări cu 6 - 8 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Gazon și grădini	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), E-Effizienz, Vitalität	2 - 5 mal 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	Rote Deckfarbe, Fruchtfestigkeit, Lager- und Transportstabilität	2 - 4 mal 6 - 8 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Baumwolle	Förderung der Jugendentwicklung (insbesondere bei Kälte und Nässe), N-Effizienz, Faserstabilität, Winterhärte	2 - 4 mal 6 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Reis	Kornqualität, Proteingehalt, N-Effizienz	1 - 2 mal 6 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.