

K

MADE IN GERMANY

Informații despre produs

Lebosol® -Potasiu TS 340

p 1,45 | pH 9,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
3 % Azot ureic (N)	44
22,4 % Potasiu solubil în apă (K ₂ O)	325
15,2 % Sulf solubil în apă (S)	220

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu potasiu și sulf	6 - 10 l/ha (Prin aplicare foliară în minimum 400 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 1%.)	în caz de necesitate
	Blattqualität, Stresstoleranz, N-Effizienz, Winterhärte	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	în caz de necesitate
La toate culturile	Zur Kalium- und Schwefelversorgung, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Erhöhung Stresstoleranz, N-Effizienz	5 - 10 l/ha (Bei Blattdüngung in mindestens 400 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 1%ig. Nicht während der Blüte.)	în caz de necesitate
La toate culturile	Zur Kalium- und Schwefelversorgung, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Erhöhung Stresstoleranz, N-Effizienz	Fertigation	Adresați-vă unui consilier expert!
Cereale	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), vitalitate	2 aplicări cu 6 l/ha	de la sfârșitul înfrățirii
Cereale	Conținutul de proteină și calitatea boabelor, producție, eficiența de utilizare a azotului (N)	1 - 2 aplicări cu 6 l/ha	începând cu înspicatul
Cereale	Proteingehalt, Stresstoleranz, Winterhärte	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Pășuni și plante furajere	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), vitalitate	2 - 5 aplicări cu 6 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Pășuni și plante furajere	Vitalität, Energiegehalt, Winterhärte	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Cartof	Reducerea susceptibilității la pătări	2 - 3 aplicări cu 6 - 10 l/ha	la formarea tuberculilor și după înflorit
Cartof	Verminderung der Anfälligkeit für Blau-/Schwarzfleckigkeit, Vitalität, Stresstoleranz	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Înflorit, producție, influență pozitivă asupra formării nodozităților, conținut de proteină	1 - 2 aplicări cu 6 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt	1 - 2 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), vitalitate	6 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Porumb	Mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Energiegehalt, Stresstoleranz	1 - 2 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), vitalitate	1 - 3 aplicări cu 6 - 10 l/ha	de la stadiul de 4 frunze până la înflorit
Rapiță	Vitalität, Stresstoleranz, Ölgehalt, Winterhärte	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Vitalität, Stresstoleranz, Ölgehalt	1 - 2 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfeclă de zahăr	Producție, eficiență de utilizare a azotului (N), vitalitate, sinteza zaharurilor	1 - 3 aplicări cu 6 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfeclă de zahăr	Vitalität, Stresstoleranz, Zuckerbildung	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpșun	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 3 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fructe semințoase	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Rotfärbung	2 - 4 mal 5 l/ha	Ab Ende Junifruchtfall
Fructe semințoase	Colorație, mărimea fructelor	2 - 4 aplicări cu 6 - 8 l/ha	de la căderea fiziologică din iunie până la recoltare
Fructe sâmburoase	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Arbuști fructiferi	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fructe citrice	Fruchtfestigkeit und -größe, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Winterhärte	2 - 4 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Struguri de masă	Sinteza zaharurilor, maturarea lemnului, calitate, rezistență la iernare	2 - 3 mal 5 l/ha	Ab Erbsengröße
Struguri de masă	Influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 6 l/ha	înaintea înfloritului
Struguri de masă	Maturarea lemnului, sinteza zaharurilor	1 - 2 aplicări cu 6 l/ha	de la compactarea ciorchinelui până la intrarea în pârgă
Struguri pentru vin	Maturarea lemnului, sinteza zaharurilor	1 - 2 aplicări cu 6 l/ha	de la compactarea ciorchinelui până la intrarea în pârgă
Struguri pentru vin	Influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale, vitalitate	1 - 2 aplicări cu 6 l/ha	înaintea înfloritului
Struguri pentru vin	Sinteza zaharurilor, maturarea lemnului, calitate, rezistență la iernare	2 - 3 mal 5 l/ha	Ab Erbsengröße
Legume	Producție, perioadă de păstrare, eficiență de utilizare a azotului (N), calitate, vitalitate	2 - 4 aplicări cu 6 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	Haltbarkeit, Qualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Producție, perioadă de păstrare, eficiență de utilizare a azotului (N), calitate, vitalitate	2 - 4 aplicări cu 6 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Haltbarkeit, Qualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Haltbarkeit, Qualität, Stresstoleranz, Wurzelstockqualität	2 - 5 mal 5 - 10 l/ha	0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Tutun	Haltbarkeit, Blattqualität, Stresstoleranz	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Brazi	Haltbarkeit, Nadelqualität, Stresstoleranz, Winterhärte	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	în caz de necesitate
Gazon și grădini	Conținutul de clorofilă, calitatea aparatului foliar, fotosinteză	2 - 4 aplicări cu 6 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Gazon și grădini	Vitalität, Frosthärte	2 - 4 mal 5 - 10 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 - 4 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Baumwolle	Haltbarkeit, Qualität, Stresstoleranz, Winterhärte	2 - 4 mal 5 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Reis	N-Eficiență, Vitalitate, Stresstoleranță	2 - 3 mal 5 - 10 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.

