

B

Informații despre produs

Lebosol® -Robustus SC

p 1,47 | pH 8,5

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
7 % Bor total (B)	103

suplimentar mai conține: 14,6 % Oxid de calciu (215 g/l CaO); 1,7 % Oxid de magneziu total (25 g/l MgO)

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu bor, transportul calciului în plantă, calitatea florilor și a polenului, calitatea fructelor, intensifică fotosintеза, maturizare uniformă, producție	0,5 - 3 l/ha (Bei Blattdüngung in 200 - 400 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 0,5%ig.)	în caz de necesitate
La toate culturile	Mehr Vitalität (z. B. bei Frost zur Blüte)	1 - 2 mal 2 l/ha (Beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Kalium 450)	în caz de necesitate
	Regenerare, depozitarea substanțelor de rezervă, rezistență la iernare	2 mal 2 l/ha	începând de la mijlocul lui august
	Regenerare, depozitarea substanțelor de rezervă, rezistență la iernare	2 aplicări cu 1 l/ha	începând de la mijlocul lui august
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu bor	0,5 - 3 l/ha (Prin aplicare foliară în 200 - 400 l apă/ha. Prin aplicarea cu pompă manuală cu soluție în concentrație de 0,5%).)	în caz de necesitate
Cereale	Produsie, calitate	1 - 2 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze până la sfârșitul înfrățitului
Cereale	N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, Winterhärte	1 - 2 mal 0,5 - 1,5 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze
Păsuni și plante furajere	N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität, Winterhärte	1 - 4 mal 0,5 - 1,5 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Păsuni și plante furajere	Produsie, calitate	1 - 4 aplicări cu 0,5 - 1 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Cartof	Produsie, calitate	1 - 2 aplicări cu 1 l/ha	de la începutul închiderii rândurilor
Cartof	Produsie, calitatea pulpei tuberculilor, rezistență pieleitei, eficiență de utilizare a azotului (N)	1 - 3 mal 1 - 2 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Înflorit, fructificare	2 aplicări cu 1 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Leguminoase	Fruchtansatz, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt	2 mal 2 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Porumb	Densitate energetică, umplerea boabelor, producția de boabe, calitatea polenului	2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Porumb	Energiedichte, N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	1 - 2 mal 2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



România S.R.L. | Sos. București-Urziceni nr. 64C | 077010 – Afumați, jud. ILFOV | Tel. +40 (0) 21.310.6903 | office@lebosol.ro | www.lebosol.de/ro

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Rapiță	Înflorit și maturizare uniforme, producție + dezvoltarea unui aparat foliar sănătos, formarea unui sistem radicular puternic, influențează pozitiv procesul de formare, rol în formarea silicveelor și al numărului de seminte/silicvă. crește rezistența la boli.	1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha	primăvara, de la pornirea în vegetație până la începutul înfloritului
Rapiță	Dezvoltarea aparatului foliar și maturitate uniformă, producție, rezistență la iernare	2 - 3 l/ha	toamna, începând cu stadiul de 4 frunze
Rapiță	Stängelstabilität, Schotenfestigkeit, N-Effizienz, Frosthärte, Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt, Winterhärte	2 - 4 mal 3 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt	1 - 2 mal 2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Floarea soarelui	Producție, calitatea polenului	2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Sfoclă de zahăr	Calitate, producție, pentru prevenirea putregaiului inimii și putregaiului uscat	1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Sfoclă de zahăr	N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. Kälte) gegen Herz- und Trockenfäule, Zuckergehalt	1 - 3 mal 3 - 4 l/ha	începând cu stadiul de 6 frunze
Căpsun	Calitatea plantelor în culturile semincerc: plante puternice, formarea lăstarilor laterali	2 aplicări cu 1 l/ha	cu 7-14 zile înainte de recoltarea stolonilor
Căpsun	Calitatea plantelor în culturile semincerc: plante puternice, formarea lăstarilor laterali	2 mal 2 l/ha	cu 7-14 zile înainte de recoltarea stolonilor
Căpsun	Pentru prevenirea deformării fructelor; înflorit, fructificare	1 - 2 aplicări cu 1 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Căpsun	Dezvoltarea mugurilor floriferi, calitatea florilor, rezistență la iernare	2 l/ha	toamna, la plantare
Căpsun	Gegen verformte Beeren, Zuckergehalt, Blütenknospenanlagen, Winterhärte	1 - 3 mal 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de buton verde
Fructe semîntoase	Înflorit, transportul calciului, fructificare, alungarea tubului polinic, calitatea pielitei	1 - 2 aplicări cu 1 l/ha (și 1 - 2 aplicări cu 1 l/ha, începând cu stadiul de fruct cu diametrul de 20-25 mm (de mărimea unei nuci))	din stadiul de buton roz până la începutul înfloritului
Fructe semîntoase	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte	2 - 4 mal 2 l/ha	Rote Knospe
Fructe sămburoase	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte	2 - 3 mal 2 l/ha	începând cu stadiul de fructificare
Fructe sămburoase	Înflorit, fructificare	1 - 2 aplicări cu 1 l/ha	de la începutul înfloritului
Arbuști fructiferi	Înflorit, fructificare	1 - 2 aplicări cu 1 l/ha	înaintea înfloritului
Arbuști fructiferi	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte	1 - 3 mal 2 l/ha	Beginn Triebwachstum
Fructe citrice	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte	2 - 4 mal 2 l/ha	Ab weiße Knospe
Pomi fructiferi	Depozitarea substanțelor de rezervă, regenerare, rezistență la iernare, calitatea florilor	2 aplicări cu 1 l/ha	după recoltare
Struguri de masă	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife	2 - 3 mal 2 l/ha	Ab Vergrößern der Gescheine
Struguri de masă	Maturare uniformă, înflorit, fructificare	2 aplicări cu 1 l/ha	de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului
Struguri pentru vin	Maturare uniformă, înflorit, fructificare	2 aplicări cu 1 l/ha	de la creșterea ciorchinilor până la începutul înfloritului
Struguri pentru vin	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte, Gleichmäßige Abreife	2 - 3 mal 2 l/ha	Ab Vergrößern der Gescheine
Legume	Înflorit, fructificare	1 - 2 aplicări cu 2 l/ha	înaintea înfloritului, când plantele au suficientă masă foliară

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



România S.R.L. | Sos. București-Urziceni nr. 64C | 077010 – Afumați, jud. ILFOV | Tel. +40 (0) 21.310.6903 | office@lebosol.ro | www.lebosol.de/ro

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Varză, verdeturi și ceapă	Pentru prevenirea putregaiului inimii verzei, salatei verzi etc., calitate internă	2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Sparanghel	Calitate (crăpături, tulpini goale, calitatea pielitei)	2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume rădăcinoase	Calitate (crăpături, tuberculi seci, brunificarea centrului tuberculilor)	2 - 3 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Legume	Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt	2 - 4 mal 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Producție, calitate	1 - 2 aplicări cu 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Blattqualität, Stängelstabilität, N-Effizienz, Vitalität (z. B. bei Kälte), Gleichmäßige Abreife, Ölgehalt	2 - 4 mal 2 - 3 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Hamei	Dezvoltarea mugurilor și lăstarilor, calitate	3 - 5 mal 2 - 3 l/ha	0,5 m Wuchshöhe bis Ernte
Hamei	Dezvoltarea mugurilor și lăstarilor, calitate	3 - 5 aplicări cu 1 - 2 l/ha	de când plantele ating talia de 50 cm până la începutul înfloritului
Tutun	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 - 3 mal 2 - 3 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Brazi	N-Effizienz, Nadelqualität, Vitalität, Winterhärte	1 - 2 mal 2 l/ha	de la dez mugurit / înfrunzit
Plante decorative	Producție, calitate	1 - 2 aplicări cu 1 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Plante decorative	N-Effizienz, Vitalität, Blattqualität	1 - 2 mal 1 - 2 l/ha	când plantele au suficientă masă foliară
Gazon și grădini	N-Effizienz, Vitalität, Halmstabilität, Frosthärte	1 - 4 mal 0,5 - 1 l/ha	în timpul perioadei de vegetație
Nüsse	Fruchtansatz, Schalenqualität, Blütenknospenanlagen, Winterhärte	1 - 3 mal 2 l/ha	Knospenschwellen
Baumwolle	Fruchtansatz, Blütenknospenanlagen, Winterhärte	1 - 3 mal 2 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Reis	N-Effizienz, Halmstabilität, Saatgutqualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	1 - 2 mal 0,5 - 1 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



România S.R.L. | Sos. București-Urziceni nr. 64C | 077010 – Afumați, jud. ILFOV | Tel. +40 (0) 21.310.6903 | office@lebosol.ro | www.lebosol.de/ro