

HeptaFe



Informații despre produs

Lebosol® -HeptaFier

p 1,25 | pH 4,0 - 5,0

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
4,5 % Fier (Fe)	56

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Pentru aprovizionarea cu fier	Peste frunze: 3 - 7 l/ha (în min. 300 l apă. Pentru aplicare cu seringă, se recomandă o sol. de 1%. Aplicațiile timpurii sunt mai eficiente! Adaosul de Aminosol® (1 l/ha) îmbunătățește umectarea.)	în caz de necesitate
	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 4 mal 3 - 7 l/ha (über das Blatt)	în caz de necesitate
La toate culturile	Zur Eisenversorgung, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Reduktion Hitzestress	3 - 7 l/ha (Über das Blatt. In mind. 300 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 1%ig. Frühe Anwendungen sind effektiver!)	în caz de necesitate
La toate culturile	Zur Eisenversorgung, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Reduktion Hitzestress	Fertigation	Adresați-vă unui consilier expert!
Porumb	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	1 - 3 mal 3 - 7 l/ha	începând cu stadiul de 4 frunze
Căpșun	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 6 mal 3 - 7 l/ha (über das Blatt)	începând cu stadiul de buton verde
Căpșun	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	mai multe tratamente cu 5 - 7 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Căpșun	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol/pe rând cu 300 - 400 ml (la 100 m de rând)	în februarie/martie
Căpșun	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	300 - 400 ml (Boden/Bandbehandlung (pro 100 m Reihe))	în februarie/martie
Fructe semănțoase	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	30 - 60 ml/Baum (über den Boden, im Gießverfahren)	în februarie/martie
Fructe semănțoase	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol cu 30 - 60 ml/pom (prin udare)	în februarie/martie
Fructe semănțoase	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare foliară cu 3 - 7 l/ha	de la stadiul de fruct de mărimea unei alune
Fructe semănțoase	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 4 mal 3 - 7 l/ha (über das Blatt)	Rote Knospe
Fructe sâmburoase	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	1 - 2 aplicări cu 3 - 7 l/ha	din stadiul de fructificare până la recoltare
Fructe sâmburoase	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 4 mal 3 - 7 l/ha (über das Blatt)	începând cu stadiul de fructificare
Fructe sâmburoase	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	30 - 60 ml/Baum (über den Boden, im Gießverfahren)	în februarie/martie
Fructe sâmburoase	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol cu 30 - 60 ml/pom (prin udare)	în februarie/martie

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.



România S.R.L. | Șos. București-Urzeni nr. 64C | 077010 - Afumați, jud. ILFOV | Tel. +40 (0) 21.310.6903 | office@lebosol.ro | www.lebosol.de/ro

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Arbuști fructiferi	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	mai multe tratamente cu 3 - 7 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Arbuști fructiferi	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 4 mal 3 - 7 l/ha (über das Blatt)	Beginn Triebwachstum
Arbuști fructiferi	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	300 - 400 ml (Boden/Bandbehandlung pro 100 m Reihe)	în februarie/martie
Arbuști fructiferi	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol/pe rând cu 400 - 500 ml (la 100 m de rând)	în februarie/martie
Fructe citrice	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	40 - 80 ml/Baum (über den Boden, im Gießverfahren)	în februarie/martie
Fructe citrice	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 6 mal 3 - 7 l/ha	Ab weiße Knospe
Struguri de masă	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	3 - 7 l/ha (a nu se aplica în timpul înfloririi)	începând cu stadiul de 3 frunze
Struguri de masă	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 6 mal 3 - 7 l/ha	3-Blatt-Stadium bis Ernte
Struguri de masă	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol, cu încorporare lângă butuc: 15 - 20 ml (în 1 l apă)	în februarie/martie
Struguri de masă	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	15 - 25 ml (mit 1 l Wasser) (über den Boden Lanzen/Bandbehandlung je Stock)	în februarie/martie
Struguri de masă	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol/pe rând cu 15 - 20 ml/butuc	în februarie/martie
Struguri pentru vin	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	Aplicarea pe frunză 3 - 7 l/ha (a nu se aplica în timpul înfloririi)	începând cu stadiul de 3 frunze
Struguri pentru vin	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol, cu încorporare lângă butuc: 15 - 20 ml (în 1 l apă)	în februarie/martie
Struguri pentru vin	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	15 - 25 ml (mit 1 l Wasser) (über den Boden Lanzen/Bandbehandlung je Stock)	în februarie/martie
Struguri pentru vin	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol/pe rând cu 20 - 30 ml/butuc	în februarie/martie
Struguri pentru vin	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 6 mal 3 - 7 l/ha	3-Blatt-Stadium bis Ernte
Legume	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 4 mal 3 - 7 l/ha (über das Blatt)	când plantele au suficientă masă foliară
Plante decorative	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	5 - 10 ml (über den Boden, mit 1 l Wasser/m ² oder bei Fertigation max. 500 ml in 1000 l Wasser)	în caz de necesitate
Plante decorative	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	3 - 7 l/ha (1 l în 100 l apă, a nu se aplica în timpul înfloririi)	în caz de necesitate
Plante decorative	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	3 - 7 l/ha (über das Blatt)	în caz de necesitate
Plante decorative	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	aplicare la sol cu 5 - 10 ml (în 1 l apă/m ² sau fertirigare prin picurare cu max. 400 ml în 1.000 l apă)	la înființarea culturii
Gazon și grădini	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 6 mal 3 - 7 l/ha (über das Blatt, in mindestens 400 l Wasser)	în timpul perioadei de vegetație
Gazon și grădini	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	50 - 70 ml/100m ² (über den Boden, in mindestens 4 l Wasser)	în timpul perioadei de vegetație
Gazon și grădini	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	5 - 7 l/ha (prin aplicare foliară în min. 400 l apă, 50 - 70 ml/100 m ² în min. 4 l apă/100 m ²)	în caz de necesitate
Nüsse	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	30 - 60 ml/Baum (über den Boden, im Gießverfahren)	în februarie/martie
Nüsse	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 4 mal 3 - 7 l/ha (über das Blatt)	începând cu stadiul de fructificare
Baumwolle	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	2 - 4 mal 3 - 7 l/ha	în caz de necesitate
Reis	Prevenirea și tratarea clorozei ferice	1 - 3 mal 3 - 7 l/ha	începând cu stadiul de 3 frunze

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina www.lebosol.ro.