

**TC****MADE IN GERMANY**

Informații despre produs

**Lebosol® -Total Care****p 1,26 | pH 2,7**

Substanțe nutritive (w/w)	g/l
9,4 % Azot total (N)	120
0,9 % Fosfor total (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	10
2,7 % Oxid de potasiu (K <sub>2</sub> O)	35

suplimentar mai conține: 0,05 % Bor solubil în apă sub formă de boretanolamină (1 g/l B); 0,3 % Cupru solubil în apă sub formă de nitrat de cupru (4 g/l Cu); 1,5 % Mangan solubil în apă sub formă de nitrat de mangan (20 g/l Mn); 0,5 % Zinc solubil în apă sub formă de nitrat de zinc (6 g/l Zn); 1,7 % Magneziu solubil în apă (20 g/l MgO); 11,6 % Materie organică (200 g/l aminoacizi)

Plantele care sunt slab aprovizionate cu nutrienți sunt mai sensibile la boli. Fertilizarea foliară asigură un aport eficient și rapid de nutrienți.”

Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
La toate culturile	Zur Nährstoffversorgung, Vitalität, Blattqualität, Ertrag, Photosyntheseleistung	Fertigation	Adresați-vă unui consilier expert!
La toate culturile	Netz-/Haftmittel zur Verbesserung der Effektivität und Verträglichkeit von Düngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen (z. B. Nachauflauf-Herbizid-Spritzungen), Ertrag, Vitalität	2 - 4 l/ha	Zu den Düngungs- bzw. Pflanzenschutzmaßnahmen (besonders bei extremen Wetterbedingungen)
La toate culturile	Tratamentul semințelor cu elemente nutritive pentru influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale	0,2 - 0,5 l/dt	odată cu tratamentul semințelor cu insecto-fungicid
La toate culturile	Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație	3 - 6 l/ha (Bei Applikation mit Rückenspritze 0,5%ig. <b>Nicht während der Blüte einsetzen</b> )	în caz de necesitate
La toate culturile	Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație	4 - 6 l/ha (Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,5%.)	în condiții de stres în vii/livezi (plantații)
La toate culturile	Tratamentul semințelor cu elemente nutritive pentru influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale	2 - 5 l/t (de material semincer)	odată cu tratamentul semințelor cu insecto-fungicid
La toate culturile	Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor postemergente, producție, vitalitate	3 - 6 l/ha	în amestec cu erbicidele postemergente, (și/sau) în condiții climatice nefavorabile
Cereale	Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație	4 - 6 l/ha	primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior
Cereale	Tratamentul semințelor cu elemente nutritive pentru influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale	3 - 4 l/t	odată cu tratamentul semințelor cu insecto-fungicid
Cartof	Reuare mai rapidă a creșterii plantelor după îndepărtarea foliei în cazul cartofului timpuriu	3 - 5 l/ha	odată cu primul tratament cu pesticide, după îndepărtarea foliei

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina [www.lebosol.ro](http://www.lebosol.ro).



Cultura	Scop/Problema	Doza de aplicare	Perioada
Varză, verdețuri și ceapă	Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație	4 - 6 l/ha	în condiții de stres în vii/livezi (plantații)
Legume rădăcinoase	Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație	4 - 6 l/ha	în condiții de stres în vii/livezi (plantații)
Plante medicinale, aromatice și mirodenii	Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație	4 - 6 l/ha	în condiții de stres în vii/livezi (plantații)
Gazon și grădini	Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație	2 - 5 aplicări cu 4 - 6 l/ha	în timpul perioadei de vegetație

Mai multe recomandări de utilizare găsiți pe pagina [www.lebosol.ro](http://www.lebosol.ro).

