

#### DESCHEREA PACHETULUI AMISTAR ERA

Este alcătuit din 2 fungicide (Amistar® și Era), Căru 2 fungicide au un efect complementar și corectează majoritatea bolilor din cultura de cereale.

- Amistar® este un fungicid cu acțiune sistemică locală translocabilă pe frunze, Amistar® interferează cu ciclul de viață al agenților patogeni. În principal în timpul germinării sporilor, prin inhibarea mobilității și germinării zoosporilor (reduce riscul infecțiilor secundare). Substanța activă azoxistrobin este preluată grație rădăcinilor.
- Era este un fungicid sistemic din grupa triazolilor. Prin creșterea combaterii bolilor în cereale și rapiță, se aplică în timpul vegetației preventiv sau când patogenii încă s-au instalat în cultură. Produsul este pedant, prin țărâș și înlocuiește azoxistrobin în unele culturi cereale.

Deține de moliere a amestecului și prepararea soluției de strop.

- Limiteți rezervorul cu 10 din volumul de apă în rezervorul strop.
- Formați spuma în viteză medie.
- Adăugați Amistar® și amestecați continuu între 3 și 5 minute.
- Adăugați Era și amestecați continuu.
- Adăugați restul de apă și amestecați.

Pachetul este dimensionat pentru 20 de hectare și cuprinde: 2x5L Amistar®, 3x1L de Era și 1x5L de Era.

Recomandări de utilizare a pachetului sintetic AMISTAR ERA:

#### Amistar®

Cultiv	Aplicare	Doz	Perioada de aplicare	Mod de aplicare	Mod de aplicare	Mod de aplicare
Grâu	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)	De la apariția primelor frunze până la începutul înfloririi și până la maturarea.	Stropire	Stropire	Stropire
Orz	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)	De la apariția primelor frunze până la începutul înfloririi și până la maturarea.	Stropire	Stropire	Stropire
Secară	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)	De la apariția primelor frunze până la începutul înfloririi și până la maturarea.	Stropire	Stropire	Stropire
Orzoare	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)	De la apariția primelor frunze până la începutul înfloririi și până la maturarea.	Stropire	Stropire	Stropire
Răpă	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)	De la apariția primelor frunze până la începutul înfloririi și până la maturarea.	Stropire	Stropire	Stropire

#### Era

Cultiv	Aplicare	Doz
Grâu	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)
Orz	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)
Secară	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)
Orzoare	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)
Răpă	Aplicare preventivă, tratament de protecție în timpul vegetației, tratament de protecție în timpul înfloririi și tratament de protecție în timpul maturării.	0,25 L/ha (0,25 L/ha)

Scambiezele noastre și-au văzut în lume și au devenit o parte din viața noastră. Sunt aici și acum, pregătite să vă ajute să vă bucurați de viață.

**3x5L + 3x1L + 1x5L**



SCAPA